

2011-2012절기 인플루엔자 접종기준

□ 접종 횟수 및 접종량

○만 9세 이상 소아 및 성인

- 1회 접종, 접종량 및 접종방법은 백신에 따라 상이함

※ 불활성화 백신: 0.5 mL(15 μ g) 근육주사 또는 0.1 mL(9 μ g) 피내주사

약독화 생백신: 0.2 mL 비감투여

○생후 6개월 이상 만 9세 미만 소아

- 기존 인플루엔자 접종기준에 따라 접종하되,

- 2009년 인플루엔자 A(H1N1) 1가 백신 또는 2010-2011절기 인플루엔자 백신 접종력이 1회라도 있는 경우 1회 접종함

- 상기 두 백신에 대한 접종력이 없는 경우 4주 간격으로 2회 접종함

<‘11-‘12절기 인플루엔자 접종기준>

■ 인플루엔자 불활성화 백신(TIV) 접종

구 분	신종플루 1가 백신 또는 ‘10-‘11절기 인플루엔자 백신 접종 경력(1회 이상)	
	있음	없음
6개월 이상~35개월 이하	접종회수 : 1회 1회 접종량 : 0.25 mL	접종회수 : 2회(4주 간격) 1회 접종량 : 0.25 mL
36개월 이상 ~ 만 9세 미만	접종회수 : 1회 1회 접종량 : 0.5 mL	접종회수 : 2회(4주 간격) 1회 접종량 : 0.5 mL

1) ‘09-‘10절기 인플루엔자 백신 접종을 1회 또는 2회 받았으나, 신종플루 1가 백신과 ‘10-‘11절기 인플루엔자 백신 접종을 둘 다 하지 않은 경우 4주 간격으로 2회 접종함

※ 3세 미만 소아의 백신 접종량을 0.5 mL로 오인하고, 0.5 mL를 1회에 투여하거나 0.25 mL를 2회에 걸쳐 접종하는 경우가 없도록 주의

■ 인플루엔자 약독화 생백신(LAIV) 접종

구 분	신종플루 1가 백신 또는 ‘10-‘11절기 인플루엔자 백신 접종 경력(1회 이상)	
	있음	없음
24개월 이상~만 9세 미만	접종회수 : 1회 1회 접종량 : 0.2 mL	접종회수 : 2회(4주 간격) 1회 접종량 : 0.2 mL

1) ‘09-‘10절기 인플루엔자 백신 접종을 1회 또는 2회 받았으나, 신종플루 1가 백신과 ‘10-‘11절기 인플루엔자 백신 접종을 둘 다 하지 않은 경우 4주 간격으로 2회 접종함

□ 예방접종 시 주의사항

- 본인 또는 보호자의 예진표 작성과 의사예진, 접종 후 20~30분간 관찰 철저히 시행
 - 「예방접종의 실시기준 및 방법」 고시 상 예진표 작성 권유 및 의사예진
 - 접종 후 관찰 및 기록관리 철저, 이상반응 시 신고 및 역학조사 즉시 시행
- 안전한 예방접종을 위해 단체예방접종 지양
 - 인플루엔자는 원칙적으로 단체예방접종 대상이 아님
 - 대유행을 제외하고(별도 고지) 접종 주체에 관계 없이 기관 방문이나 간이 접종실에서 단체접종 형태의 접종은 억제
 - 단, 보건소가 사회복지시설생활자 등에 대한 접종 시 기준을 준수하면서 안전 예방접종을 실시
- 백신 제품별로 허가된 용법·용량을 준수하여 접종

<다음의 백신은 허가된 연령 외에는 접종하지 않도록 주의 >

제조사	백신명	접종연령
한국노바티스(주)	플루아드주	만 65세 이상
한국산도스(주)	반트플루주	만 65세 이상
사노피파스티르(주)	아이디플루9마이크로그렘주	만 18~59세
사노피파스티르(주)	아이디플루15마이크로그렘주	만 60세 이상
(주)녹십자	플루미스트 인트라나잘 스프레이	생후 24개월~만 49세
(주)한국백신	플루코박스PF주	만 5세 이상